

Les maladies sexuellement transmissibles



JE M'INFORME
JE ME PROTÈGE
JE ME FAIS
EXAMINER

Les maladies sexuellement transmissibles



JE M'INFORME
JE ME PROTÈGE
JE ME FAIS
EXAMINER

Sommaire

- 4** Les maladies sexuellement transmissibles (MST)
- 6** Infection à VIH/SIDA
- 8** Herpès génital
- 10** Syphilis ou vérole
- 12** Papilloma Virus (HPV)
- 14** Hépatite virale A, B, C
- 15** Gonorrhée (ou Blennorragie)
- 16** Chlamydia Trachomatis
- 17** Gale
- 18** N'oubliez jamais
- 20** Comment affronter les MST ?

Les maladies sexuellement transmissibles (MST)

Les rapports sexuels non protégés (qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels, vaginaux, oraux ou anaux) peuvent favoriser la diffusion du VIH et d'autres infections plus ou moins graves.

Elles sont définies maladies sexuellement transmissibles (MST), car elles sont provoquées par des bactéries, des virus ou des parasites transmis pendant les rapports sexuels, notamment par contact direct entre les fluides corporels infectés (sperme, sécrétions vaginales, sang issu de petites lésions) et les muqueuses génitales, anales ou buccales.

Il est fréquent qu'aucun symptôme n'apparaisse lors de la phase initiale (infections asymptomatiques), et c'est justement pour cette raison que la personne qui a contracté la maladie est susceptible de la transmettre, inconsciemment, à d'autres personnes. Le traitement précoce garantit souvent la guérison complète ou du moins la réduction des complications ainsi qu'un meilleur pronostic.

Outre la transmission sexuelle, certaines de ces infections (VIH, hépatites B et C, syphilis) peuvent être transmises par du sang contaminé (blessures, y compris de petites dimensions, échange de seringues) ou de la mère à l'enfant à travers le placenta (lors de la grossesse), au moment de l'accouchement ou au cours de l'allaitement.

Dans certains cas, la transmission peut également avoir lieu à travers la salive (par exemple : papillomavirus et virus Herpes simplex) ou par l'échange d'« objets » sexuels. Enfin, il est nécessaire de souligner qu'il existe une possibilité de contamination par le contact peau-peau (gale) ou par les matières fécales (dans le cas du virus de l'hépatite A).

IL EST BON DE SAVOIR QUE

- LA PRÉSENCE D'UNE MST ACCROIT LE RISQUE DE CONTAMINATION PAR LE VIH.
- IL EST POSSIBLE D'ÊTRE CONTAMINÉ PAR PLUSIEURS MST SIMULTANÉMENT.
- LA RÉINFECTION EST POSSIBLE: LES MST NE DONNENT PAS D'IMMUNITÉ PERMANENTE.
- LA PERSONNE TOUCHÉE PAR UNE MST PEUT ÊTRE CONTAGIEUSE PENDANT DE NOMBREUSES ANNÉES, Y COMPRIS EN L'ABSENCE DE SYMPTÔMES (EX. : INFECTION VIH NON TRAITÉE).

QUELLES SONT LES PERSONNES LES PLUS VULNÉRABLES ?

- TOUTE PERSONNE AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC UNE PERSONNE PORTEUSE DE MST RISQUE DE CONTRACTER UNE INFECTION SEXUELLE.
- UN SEUL RAPPORT SEXUEL PEUT SUFFIRE POUR LA CONTAGION.
- LE NOMBRE DE PARTENAIRES SEXUELS AUGMENTE LA PROBABILITÉ DE RENCONTRER UNE PERSONNE ATTEINTE D'UNE MST.

LA BONNE UTILISATION
DU PRÉSERVATIF CONSTITUE
LA MÉTHODE
LA PLUS EFFICACE
POUR RÉDUIRE LE RISQUE
DE CONTRACTER
DES MALADIES
SEXUELLEMENT
TRANSMISSIBLES.

Infection à VIH/SIDA

Le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) se trouve dans le sang, dans le sperme, dans les sécrétions vaginales et dans le lait maternel des personnes infectées. Outre les rapports sexuels non protégés avec des personnes séropositives ne suivant pas de thérapie et la transmission par sang contaminé, la contamination peut avoir lieu de la mère infectée à l'enfant pendant la grossesse, au moment de l'accouchement et lors de l'allaitement au sein.

La présence simultanée de lésions génitales provoquées par une autre infection sexuellement transmissible (herpès génital ou syphilis, par exemple) peut augmenter la possibilité de contracter le VIH au cours de rapports sexuels.

Les personnes atteintes du VIH sont susceptibles de ne pas percevoir de symptômes pendant un certain temps. L'infection n'en demeure pas moins présente et transmissible. Il est par conséquent **fondamental d'effectuer le test de dépistage du VIH**, notamment si des rapports sexuels non protégés ont eu lieu. Pour effectuer ce test, il est possible de s'adresser à son médecin traitant ou de se rendre directement dans les centres « test & counselling » où **il est possible de faire le test gratuitement et de façon anonyme (pour tout renseignement : www.helpaids.it/test, numéro vert SIDA 800 856080).**

Le diagnostic rapide d'infection par VIH est extrêmement important, car il permet d'intervenir avec un traitement spécifique qui ne soigne pas définitivement l'infection, puisqu'il n'élimine pas le virus de l'organisme, mais empêche sa multiplication.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
SUPPLÉMENTAIRE ET/OU POUR TROUVER UN
CENTRE PrEP EN ÉMILIE-ROMAGNE,
CONSULTEZ LE SITE helpaids.it

Si le traitement est correctement suivi en respectant les dosages, l'infection par VIH peut être bien contrôlée et l'espérance de vie des personnes séropositives est comparable à celle de la population générale.

Les personnes à charge virale nulle ne transmettent pas l'infection. Dans les faits, la thérapie antirétrovirale empêche la progression clinique de l'infection (SIDA), caractérisée par un taux de mortalité élevé.

LE TRAITEMENT ANTIRÉTROVIRAL PEUT ÉGALEMENT ÊTRE UTILISÉ POUR ÉVITER LA TRANSMISSION DU VIH À LA SUITE D'UN ÉVÉNEMENT À RISQUE, PAR EXEMPLE APRÈS UN RAPPORT NON PROTÉGÉ OCCASIONNEL OU UN RAPPORT AU COURS DUQUEL LE PRÉSERVATIF S'EST ROMPU. IL S'AGIT DANS CE CAS DE PROPHYLAXIE POST-EXPOSITION (PPE). LA PPE, PRESCRITE PAR UN MÉDECIN INFECTIOLOGUE OU PAR UN MÉDECIN DES URGENCES AUX PERSONNES DÉCLARÉES SÉRONÉGATIVES À L'ISSUE DU DÉPISTAGE, DOIT ÊTRE ADMINISTRÉE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE ET DANS TOUS LES CAS DANS LES 72 HEURES SUIVANT LA POTENTIELLE EXPOSITION. ELLE N'EST TOUTEFOIS PAS EFFICACE À 100 % ET NE DOIT PAS ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME UN SUBSTITUT DU PRÉSERVATIF.

LA PROPHYLAXIE PRÉ-EXPOSITION (PrEP), EN REVANCHE, EST UN TRAITEMENT MÉDICAMENTEUX ANTIRÉTROVIRAL PRIS AVANT UN RAPPORT SEXUEL POTENTIELLEMENT À RISQUE.

ELLE EST CONSEILLÉE AUX PERSONNES SÉRONÉGATIVES AYANT DES COMPORTEMENTS SEXUELS À HAUT RISQUE D'INFECTION PAR VIH.

**N'OUBLIEZ PAS :
LE TEST DU VIH
EST GRATUIT
ET PEUT ÊTRE EFFECTUÉ
DE FAÇON ANONYME!**

Herpès génital

Il est causé par un virus (Herpes simplex de type 1 ou 2) qui touche les muqueuses et la peau.

Les lésions cutanées sont caractérisées par l'apparition de petites vésicules en grappe qui se transforment en ulcères, puis en croûtes. Les muqueuses présentent des érosions en grappe. La douleur et le prurit sont intenses.

Chez la femme, l'herpès génital est surtout localisé au niveau des grandes et petites lèvres, mais le vagin et le col de l'utérus peuvent également être touchés, avec des pertes séreuses ou blanchâtres.

Chez l'homme, les lésions se concentrent principalement sur la zone du gland et du prépuce, mais elles peuvent également se manifester au niveau de l'anus et de la zone environnante.

Aussi bien chez l'homme que la femme, l'herpès génital peut toucher la peau de la zone génitale, du pubis, de l'aîne et du périnée (c'est-à-dire la zone qui contient le scrotum ou la vulve et va jusqu'au coccyx). En outre, des lésions peuvent être localisées à d'autres endroits du corps.

La transmission a lieu lors d'un contact étroit avec une personne présentant des lésions. Cependant, la contagion peut avoir lieu même si ces dernières ne sont pas visibles.

POUR TOUTE INFORMATION
CONSULTEZ LE SITE guidaservizi.saluter.it
EN SAISSANT **HERPES GENITALE**
DANS LE CHAMP DE RECHERCHE

Les lésions guérissent en 1 à 4 semaines. Cependant, étant donné qu'après la première infection le virus demeure dans le corps pour toujours en état de dormance et peut se réactiver périodiquement, la maladie a tendance à se représenter (récidive) à une fréquence variable selon l'individu, notamment à la suite de conditions déterminant un stress psycho-physique et/ou une dépression du système immunitaire.

CONCERNANT LE TRAITEMENT, DES MÉDICAMENTS ANTIVIRAUX SONT DISPONIBLES SUR ORDONNANCE MÉDICALE. AUCUN TRAITEMENT N'EST À MÊME D'ÉLIMINER LE VIRUS DE L'ORGANISME, LA THÉRAPIE EST UTILE POUR ATTÉNUER LA SYMPTOMATOLOGIE ET RÉDUIRE LA DURÉE DE LA PHASE AIGUË DE LA MALADIE. L'INFECTION CONTRACTÉE PAR L'ENFANT AU MOMENT DE L'ACCOUCHEMENT PEUT ÊTRE PARTICULIÈREMENT GRAVE (HERPÈS NÉONATAL).

**N'oubliez pas :
DES MÉDICAMENTS
SPÉCIFIQUES
UTILES
POUR LE TRAITEMENT
SONT DISPONIBLES.**

Syphilis ou vérole

Il s'agit d'une maladie causée par un germe, le tréponème pâle, qui se transmet à travers les sécrétions contaminées.

Les lésions provoquées par la syphilis sont principalement localisées au niveau des parties génitales, de l'anus et du rectum et de la bouche.

La maladie se développe en plusieurs phases ou stades. Lors de la phase initiale (stade primaire), la maladie se présente comme une ulcération généralement localisée sur le col de l'utérus, le pénis ou au niveau de la zone anale, associée à une adénopathie près de la zone de l'infection, notamment au niveau de l'aîne.

Les personnes atteintes de syphilis ne se rendent pas toujours compte d'avoir des lésions, car il est fréquent que ces dernières ne soient ni douloureuses ni prurigineuses. La syphilis peut être facilement transmise dès ce stade.

Dans les formes les plus avancées de la maladie, des éruptions cutanées peuvent apparaître, puis les os, le foie, le cœur et le cerveau peuvent être touchés.

POUR TOUTE INFORMATION
CONSULTEZ LE SITE guidaservizi.saluter.it
EN SAISSANT **SIFILIDE**
DANS LE CHAMP DE RECHERCHE

L'infection contractée au cours de la grossesse ou de l'accouchement peut entraîner une fausse couche, le décès néonatal, la naissance prématurée de nouveau-nés de faible poids et/ou atteints d'une maladie généralisée avec dommages au système nerveux, surdité, malformations osseuses.

LE DIAGNOSTIC EST EFFECTUÉ GRÂCE À UNE SIMPLE ANALYSE DE SANG.

UN TRAITEMENT ANTIBIOTIQUE PERMET DE SOIGNER LA SYPHILIS.

**N'OUBLIEZ PAS :
UN DIAGNOSTIC
RAPIDE
À L'AIDE DE
SIMPLES ANALYSES
DE SANG
EST FONDAMENTAL!**

Papilloma Virus (HPV)

Les papillomavirus (HPV) sont un groupe de virus très répandus: plus de 120 sérotypes ont été identifiés, parmi lesquels plus de 40 peuvent provoquer des infections des muqueuses génitales (principalement au niveau du col de l'utérus et du vagin), anales et de l'oropharynx (la partie la plus interne de la bouche). La transmission de ces virus peut également avoir lieu à travers des contacts au niveau génital sans pénétration. Par conséquent, l'utilisation du préservatif n'élimine pas entièrement le risque de contamination.

Certains sérotypes (ex. 6 et 11) sont responsables des verrues génitales, des lésions bénignes, mais douloureuses, planes ou de type verruqueux (condylomes pointus ou crêtes de coq), localisées, aussi bien chez l'homme que la femme, dans la zone génitale et/ou anale. D'autres sérotypes (ex. 16 et 18) peuvent provoquer des altérations des muqueuses génitales, anales et de l'oropharynx qui, si elles persistent sans être soignées, peuvent évoluer en cancer sur plusieurs années. Les HPV sont responsables de la totalité des cancers du col de l'utérus et d'une partie des cancers de l'anus, du vagin, du pénis, de la vulve et de l'oropharynx.

L'infection à HPV est très fréquente, dans la plupart des cas elle est transitoire et régresse spontanément sans causer de maladie. Lorsque l'infection évolue en maladie, il est possible d'intervenir avec des traitements efficaces.

Cependant, il n'existe pas à ce jour de traitement à même d'éliminer les virus de l'organisme de façon définitive.

POUR TOUTE INFORMATION
CONSULTEZ LE SITE guidaservizi.saluter.it
EN SAISSANT **HPV**
DANS LE CHAMP DE RECHERCHE

LA RÉGION ÉMILIE-ROMAGNE GARANTIT LA VACCINATION GRATUITE AUX JEUNES FILLES ÂGÉES DE 12 À 26 ANS, AUX JEUNES HOMMES ÂGÉS DE 12 À 18 ANS, AUX PERSONNES SÉROPOSITIVES, AUX HOMMES AYANT DES RAPPORTS SEXUELS AVEC D'AUTRES HOMMES (HSH), AUX PERSONNES S'ADONNANT À LA PROSTITUTION (TRAVAILLEURS DU SEXE), AUX PERSONNES DEVANT PRENDRE DES MÉDICAMENTS IMMUNOMODULATEURS OU IMMUNOSUPPRESSEURS ET AUX FEMMES AYANT RÉCEMMENT SUBI UN TRAITEMENT POUR DES LÉSIONS LIÉES AUX HPV.

LES PERSONNES N'APPARTENANT À AUCUNE DES CATÉGORIES SUSMENTIONNÉES PEUVENT ACCÉDER À LA VACCINATION EN PARTICIPANT AUX FRAIS, AU SEIN DES CENTRES DE VACCINATION DES UNITÉS SANITAIRES LOCALES.

EN OUTRE, POUR LA PRÉVENTION DU CANCER DU COL DE L'UTÉRUS, LA RÉGION ÉMILIE-ROMAGNE OFFRE DEPUIS 1996 DE FAÇON ACTIVE ET GRATUITE LE PROGRAMME DE DÉPISTAGE À TOUTES LES FEMMES ÂGÉES DE 25 À 64 ANS. ACTUELLEMENT, LES FEMMES ÂGÉES DE 25 À 29 ANS PEUVENT RÉALISER GRATUITEMENT UN FROTTIS TOUS LES 3 ANS, TANDIS QUE LES FEMMES ÂGÉES DE 30 À 64 ANS PEUVENT EFFECTUER LE TEST HPV TOUS LES 5 ANS.

**N'OUBLIEZ PAS :
POUR LA PRÉVENTION
DES INFECTIONS À HPV,
UN VACCIN EFFICACE ET SÛR
EST DISPONIBLE.**

Hépatite virale A, B, C

Les virus de l'hépatite A (HAV = Hepatitis A virus), B (HBV = Hepatitis B virus) et C (HCV = Hepatitis C virus) **causent des infections au foie** susceptibles de se présenter avec ou sans symptômes.

Le virus de l'hépatite A est présent dans les selles et dans le sang des personnes contaminées. La transmission a principalement lieu par les aliments, mais aussi au cours de rapports oro-anaux ou en portant à la bouche les doigts ou des objets contaminés par les selles.

Outre les rapports sexuels, **le virus de l'hépatite B** peut être transmis par le sang et d'autres liquides biologiques de personnes contaminées et par la mère contaminée à l'enfant, au moment de l'accouchement.

Le virus de l'hépatite C se transmet principalement par le sang; la transmission sexuelle est documentée, mais moins probable.

L'ictère, c'est-à-dire la coloration jaunâtre de la peau et du blanc de l'œil, est le symptôme le plus caractéristique des formes aiguës d'hépatite ; il est accompagné d'urines de couleur sombre et de selles blanchâtres.

**N'OUBLIEZ PAS :
POUR PRÉVENIR
L'HÉPATITE A
ET L'HÉPATITE B,
DES VACCINS EFFICACES
ET SÛRS
SONT DISPONIBLES!**

POUR TOUTE INFORMATION
CONSULTEZ LE SITE
guidaservizi.saluter.it
EN SAISSANT
VACCINAZIONI EPATITE
DANS LE CHAMP DE RECHERCHE

Gonorrhée (ou Blennorragie)

Elle est causée par un germe, le *Neisseria gonorrhoeae* ou gonocoque, **qui infecte les voies urinaires basses chez l'homme et les voies urinaires et les organes génitaux chez la femme.** Elle peut également toucher le rectum et le pharynx aussi bien chez l'homme que chez la femme.

L'infection entraîne des douleurs mictionnelles (brûlures en urinant) et des écoulements de couleur blanche/jaunâtre vaginaux et à l'extrémité de la verge. Lorsque l'infection est localisée au niveau du rectum, elle se manifeste à travers des écoulements de couleur blanche/jaunâtre, un prurit anal, des saignements de l'anus, des douleurs abdominales.

Chez la femme, l'infection asymptomatique non traitée peut causer une inflammation des organes de l'appareil génital, avec une réduction de la fertilité.

La femme enceinte souffrant de cette infection peut contaminer l'enfant pendant l'accouchement ; l'infection néonatale qui en découle est principalement localisée au niveau des yeux, mais il existe également des cas d'arthrite, de méningite et d'infection du cœur.

**N'OUBLIEZ PAS :
LA GONORRHÉE SE SOIGNE
À L'AIDE D'ANTIBIOTIQUES.
LE TRAITEMENT DOIT ÊTRE
ADMINISTRÉ
ÉGALEMENT AU PARTENAIRE
DE LA PERSONNE
CONTAMINÉE.**

POUR TOUTE INFORMATION
CONSULTEZ LE SITE
guidaservizi.saluter.it
EN SAISSANT
GONORREA
DANS LE CHAMP
DE RECHERCHE

Chlamydia Trachomatis

Ce germe est responsable d'urétrites et, chez la femme, d'infections du col de l'utérus.

Chez la femme, les infections ne génèrent aucun symptôme dans environ 70 % des cas, tandis que chez l'homme il est plus facile que des symptômes se manifestent.

Lorsqu'ils sont présents, les symptômes sont similaires à ceux de la gonorrhée : douleurs en urinant, écoulements de couleur transparente, blanche ou jaunâtre depuis le pénis ou le vagin.

Le diagnostic est souvent effectué une fois que l'infection s'est compliquée, chez l'homme avec une prostatite et chez la femme avec une salpingite ou une inflammation pelvienne, ce qui est susceptible de réduire la fertilité.

L'infection à Chlamydia trachomatis peut aussi toucher le pharynx et le rectum à la suite de rapports oraux ou anaux.

**N'OUBLIEZ PAS :
CES INFECTIONS
SONT SOIGNÉES À L'AIDE
D'ANTIBIOTIQUES.
LE TRAITEMENT DOIT ÊTRE
ADMINISTRÉ
ÉGALEMENT AU PARTENAIRE
DE LA PERSONNE
CONTAMINÉE.**

POUR TOUTE INFORMATION
CONSULTEZ LE SITE
guidaservizi.saluter.it
EN SAISSANT
CHLAMYDIA
DANS LE CHAMP
DE RECHERCHE

Gale

La gale est une maladie parasitaire causée par un acarien appelé *Sarcoptes scabiei*.

Elle se transmet par le contact direct peau-peau. Bien que ce soit rare, la transmission peut avoir lieu à travers le linge, les draps, les serviettes ou d'autres vecteurs, récemment utilisés par une personne contaminée.

La maladie se manifeste essentiellement par une forte démangeaison sur tout le corps, de prédominance nocturne, et l'apparition sur la peau de lésions, mais aussi de plaques rouges, avec ou sans relief, auxquelles s'associent des lésions de grattage.

Les lésions sont fréquemment localisées entre les doigts des mains, aux poignets, dans les plis du coude, sous les aisselles, dans la zone située sous la poitrine, autour du nombril, sur les fesses et dans le creux du genou.

**N'OUBLIEZ PAS :
IL EXISTE DES TRAITEMENTS
ANTIPARASITAIRES
SPÉCIFIQUES
POUR L'ÉRADIQUER.**

POUR TOUTE INFORMATION
CONSULTEZ LE SITE
guidaservizi.saluter.it
EN SAISSANT
SCABBIA
DANS LE CHAMP
DE RECHERCHE

N'oubliez jamais

Le préservatif constitue l'instrument le plus efficace pour réduire le risque de contracter la plupart des infections sexuellement transmissibles.

Il doit être utilisé correctement et il est nécessaire de contrôler, avant l'utilisation, son état de conservation et sa date de péremption.

Il doit être mis, sans être endommagé par les ongles ou tout objet pointu ou coupant tel que des bagues, des fermetures éclair et des boucles de ceinture, avant le rapport sexuel (vaginal, anal, oral) et retiré uniquement après l'éjaculation, en évitant que le sperme ne s'en écoule. En effet, il est faux que le fait de retirer le pénis (sans préservatif) avant d'atteindre l'orgasme permet d'éviter la transmission de virus, bactéries et parasites.

Le préservatif doit être utilisé une seule fois : s'il glisse, il est conseillé d'en utiliser un nouveau avant de poursuivre le rapport. En outre, il est conseillé d'utiliser un nouveau préservatif à chaque changement de type de pénétration.

Les préservatifs doivent être conservés, à l'intérieur de leur emballage original, dans un lieu frais et sec, loin de toute source de chaleur et de la lumière directe du soleil. Pour les personnes allergiques au latex, des préservatifs réalisés avec des matériaux hypoallergéniques sont disponibles dans le commerce.

Il est nécessaire de demander conseil à son pharmacien ou à son médecin quant à la compatibilité du préservatif avec les produits à usage local à appliquer sur le pénis ou dans le vagin, comme les lubrifiants.

Il est très rare qu'un préservatif se déchire, mais si cela arrive, pour minimiser le risque de contracter des infections sexuellement transmissibles et le risque de grossesse indésirable, il est nécessaire de retirer immédiatement le pénis et de laver les parties génitales, l'anus ou la bouche afin d'éliminer le sperme présent.

Il convient de rappeler que, bien qu'encore peu répandu, il existe également le préservatif féminin, appelé « Femidom », constitué d'une gaine transparente en polyuréthane à introduire dans le vagin avant le rapport sexuel. Il s'agit d'une méthode tout aussi efficace qui protège la femme contre les grossesses indésirables et contre les maladies sexuellement transmissibles. Le préservatif masculin et le préservatif féminin ne doivent jamais être utilisés simultanément.

-
- **L'EFFET DES DROGUES ET DE L'ALCOOL PEUT ABAISSER LE NIVEAU D'ATTENTION ET D'AUTO-PROTECTION**, NOTAMMENT AU MOMENT DU RAPPORT SEXUEL : C'EST AINSI QUE LES RISQUES SONT SOUS-ESTIMÉS ET QUE DES RAPPORTS SEXUELS OCCASIONNELS NON PROTÉGÉS ONT LIEU, AVEC LA POSSIBILITÉ DE TRANSMISSION D'INFECTIONS.
 - POUR ÉVITER DE S'EXPOSER PAR INADVERTANCE À DU SANG CONTAMINÉ, **IL CONVIENT D'ÉVITER L'UTILISATION COMMUNE AVEC D'AUTRES PERSONNES DE RASOIRS, CISEAUX, BROSSES À DENTS ET TOUT AUTRE OBJET À MÊME DE PÉNÉTRER LA PEAU OU D'ENTRAÎNER DES LÉSIONS DES MUQUEUSES.**
 - **L'EMPLOI DE DROGUES PAR INJECTION PEUT PROVOQUER LA TRANSMISSION DE VIRUS.** SI UNE PERSONNE EN FAIT L'USAGE, IL EST INDISPENSABLE QU'ELLE UTILISE TOUJOURS DES AIGUILLES ET DES SERINGUES JETABLES. L'ÉCHANGE D'AIGUILLES ET DE SERINGUES PEUT EN EFFET ÊTRE UN VECTEUR DE TRANSMISSION DE SANG CONTAMINÉ ET DONC D'INFECTION.

Comment affronter les MST ?

Les MST provoquent un désagrément allant au-delà de la maladie, car elles impliquent la sphère intime de la personne et de ses relations.

EN REVANCHE, IL EST PRIMORDIAL DE COMPRENDRE QUE, COMME POUR TOUT AUTRE PROBLÈME, VOTRE MÉDECIN GÉNÉRALISTE ET/OU D'AUTRES SPÉCIALISTES PEUVENT VOUS AIDER.

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT OBTENIR DES INFORMATIONS ET DE L'AIDE DE LA PART D'ASSOCIATIONS DE PATIENTS ET/OU DE COMMUNAUTÉS IMPLIQUÉES DANS LA PRÉVENTION ET LA LUTTE CONTRE CERTAINES DE CES INFECTIONS.

En outre, pour la prévention et l'assistance aux personnes atteintes de maladies sexuellement transmissibles, le Service sanitaire régional propose des cabinets de consultation ou des parcours diagnostico-thérapeutiques spécifiques ; dans tous les cas, la confidentialité la plus totale est garantie, voire l'anonymat.

Le médecin généraliste est la première personne de référence, mais il est aussi possible de s'adresser directement aux opérateurs des cabinets médicaux spécifiques (planning familial, maison des jeunes, dispensaires dédiés aux infections sexuellement transmissibles, etc.).



**N'oubliez pas :
VOTRE MÉDECIN
OU D'AUTRES
SPÉCIALISTES
PEUVENT VOUS AIDER!**





Vous pouvez vous renseigner :

EN APPELANT LE NUMÉRO VERT

800 033 033

du lundi au vendredi **de 8h30 à 18h00**

le samedi **de 8h30 à 13h00**

SUR LE SITE

guidaservizi.saluter.it

en saisissant

dans le champ de recherche

"INFEZIONI A TRASMISSIONE SESSUALE"

SUR LE SITE

helpaids.it

pour en savoir plus sur le VIH et le SIDA

SOUS LA DIRECTION DE :

Giovanna Mattei, Christian Cintori, Giulio Matteo, Maria Grazia Pascucci

COORDINATION ET SUPERVISION DE LA RÉDACTION :

Angela Lucarelli, Caterina Di Monte