

Coorte Condor

- Studio osservazionale di coorte che arruola tutti i pazienti con nuova diagnosi di infezione da HIV dal 01 Gennaio 2006 .

# Obiettivi principali

- 1) Valutare le caratteristiche anagrafiche, epidemiologiche, lo stadio dell'infezione da HIV al momento della diagnosi e la presenza di patologie HIV e non HIV correlate
- 2) Valutare l'incidenza della mortalità globale e per cause HIV-correlate e non HIV correlate
- 3) Valutare l'incidenza di nuove patologie HIV e non HIV correlate

# Obiettivi secondari

- 1) Valutare la frequenza dei fallimenti virologici, i fattori ad essa correlati e l'esito delle differenti modalità di gestione
- 2) Valutare la frequenza della perdita al follow-up e la mobilità intercentro della popolazione

# Arruolati

<b>CENTRO</b>	<b>Numero Pazienti</b>
<b>FERRARA</b>	203
<b>MODENA</b>	512
<b>REGGIO EMILIA</b>	343
<b>RIMINI</b>	395
<b>Totale</b>	1493

Casi notificati all'osservatorio regionale dal 2006 al 2012: 3109

# Età e sesso

	<b>Numero (%)</b>	<b>Età (mediana e range interquartile)</b>
<b>Maschi</b>	1048 (72%)	39 (32-47)
<b>Femmine</b>	405 (28%)	36 (28-45)
<b>Totale</b>	1453	38 (31-46)


# Modalità di trasmissione

Trasmissione	Maschi	Femmine	Totale
<b>Tossico</b>	82 (7,8%)	17 (4,2%)	99 (6.8%)
<b>Omosex</b>	377 (36%)		377 (26%)
<b>Eterosex</b>	495 (47,2%)	351 (86,7%)	846 (58,2%)
<b>Trafsusione (emofilia)</b>	8	6	14 (1%)
<b>Non noto</b>	86 (8,2%)	31 (7,6%)	117 (8%)
	1048 (72%)	405 (28%)	1453

# Modalità di trasmissione

Trasmissione	Maschi	Femmine	Totale
Tossico	82 (7,8%)	17 (4,2%)	99 (6.8%)
Omosex	377 (36%)		377 (26%)
Eterosex	495 (47,2%)	351 (86,7%)	846 (58,2%)
Traffusione (emofilia)	8	6	14 (1%)
Non noto	86 (8,2%)	31 (7,6%)	117 (8%)
	1048 (72%)	405 (28%)	1453

Figura 22 – Distribuzione percentuale delle nuove diagnosi di infezione da HIV per modalità di trasmissione anno di diagnosi. Emilia-Romagna, 2006-2012.





# Infezione acuta

	Cronica	Acuta	% acuta	Tot
Maschi	930	118	11,3	1048
Femmine	379	26	6,4	405
	1309	144	9,9	1453

# Infezione acuta

	Cronica	Acuta	% acuta	Tot
Maschi	930	118	11,3	1048
Femmine	379	26	6,4	405
	1309	144	9,9	1453

	Cronica	Acuta	% acuta	Tot
Tossico	93	6	6,1	99
Omosex	304	73	19,4	377
Eterosex	788	58	6,9	846
Trafsusione (emofilia)	13	1	7,1	14
Non noto	111	6	5,1	117

# AIDS alla diagnosi di infezione da HIV

	<b>Non Aids</b>	<b>AIDS</b>	
<b>Maschi</b>	852	196 (18,7%)	1048
<b>Femmine</b>	341	64 (15,8%)	405
<b>Totale</b>	1193 (82,1%)	260 (17,9%)	1453

Secondo l'osservatorio regionale, dal 2006 al 2012, AIDS alla diagnosi nel 16,6% dei notificati

# Mortalità

	Viventi	Deceduti	%
Maschi	995	53	5,3*
Femmine	394	11	2,7*
Totale	1389	64	4,6

\*Chi quadro:  $p= 0,047$

# Prima terapia

Terapia	Numero	%
2NRTI+IP	720	69,0
2NRTI+NNRTI	278	26,7
3NRTI	18	1,7
NRTI+IP+INI	15	1,4
NRTI+INI	7	0,7
IP+INI	3	0,3
Altro	2	0,2
<b>Totale</b>	<b>1043</b>	<b>100</b>

- Prima terapia 1043
- Totale pazienti 1453
- Terapia iniziata nel 71,8%